

Kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet

ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

Kontinuitet	
Ko1+7	Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom
Ko3	Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet
Ko4	Kontinuitetsindex för personer med SIP (Sammanhållen individuell plan)
Ko5	Kontinuitetsindex för alla patienter
Ko6	Kontinuitetsindex vid bensår
Ko8	Andel infektionsepisoder hos listad befolkning som sköts på egna vårdeneheten
Samsjuklighet	
Ss1	Andel patienter med samsjuklighet
Ss2	Andel patienter med samsjuklighet och 0-≥6 läkarbesök
Prioritering	
Pr1	Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök
Pr2	Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärtkärlsjukdom
Pr3	Behandling vid depression och samsjuklighet
Pr4+12	Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan
Pr5+13	Andel patienter med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan
Pr11	Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom
Samverkan	
Sa1	Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård
Sa2	Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård eller på sjukhus
Sa3	Andel patienter som haft återbesök efter exacerbation KOL
Sa4+8	Andel personer med SIP
Sa5+9	Andel personer med SIP som följts upp
Sa6	Andel personer som haft återbesök efter TIA/Stroke
Sa7	Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök
Äldre	
Äld1	Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas
Äld2	Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktionen som har uppmätt njurfunktion
Äld3	Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥75 år
Äld4	Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥75 år

Läkemedel	
Lm1	Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation
Lm2	Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk
Lm3	Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5	Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnmedel med ≤30 tabletter
Lm6	Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8	Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletter
Lm9	Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantibehandling
Lm10	Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning
Lm 11	Andel patienter med förskrivning av opioider
Lm 13	Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedel
Levnadsvanor	
Le3	Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/stroke, RA, psoriasis)
Le4	Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/stroke, RA, psoriasis)
Le7+13	Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)
Le8+14	Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)
Le9	Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)
Le10	Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)
Le11+15	Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor (alla grupper, hypertoni)
Le12+16	Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, hypertoni)

FoKUS - Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan

Material för att komma igång eller vidareutveckla ert arbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet finns på: www.primarvardskvalitet.se.

KRONISKA SJUKDOMAR

Artros	
Ar1	Andel patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts
Ar2+11	Förekomst av diagnos artros
Ar3+12	Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola
Ar4+13	Andel patienter med artros som fått handledd träning
Astma	
As1	Andel patienter med astma och underhållsbehandling som har varit på återbesök
As2	Förekomst av diagnos astma
Bensår	
Be1	Förekomst av diagnos bensår
Be2	Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår
Be3	Andel patienter med kompressionsbehandling vid venösa bensår
Hypertoni	
Bt1	Förekomst av diagnos hypertoni
Bt2	Blodtryck vid hypertoni
Demens	
Dem1+11	Förekomst av diagnos demens
Dem2	Andel patienter med demens och antipsykotika
Dem3	Andel patienter med demens som har varit på återbesök
Dem4	Andel patienter med Alzheimer som behandlas med demensläkemedel
Dem5	Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6+12	Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut
Dem7+13	Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel
Diabetes	
Di1	Förekomst av diagnos diabetes
Di2	HbA _{1c} vid diabetes
Di3	Blodtryck vid diabetes
Di4	Andel patienter med diabetes och behandling med statiner
Di5	Andel patienter med diabetes som har varit på återbesök
Di6	Andel patienter med diabetes med uppgift om albuminuri
Förmaksflimmer	
Fö1	Förekomst av diagnos förmaksflimmer
Fö2	Andel patienter med antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc 0-≥2
Fö3	Andel patienter med förmaksflimmer som har varit på återbesök

Hjärtsvikt	
Hj1	Förekomst av diagnos hjärtsvikt
Hj2	Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockerare
Hj3	Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med RAAS-hämmare
Hj4	Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök
Hj5	Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockerare och RAAS-hämmare
Urininkontinens	
Ink1+11	Förekomst av diagnos urininkontinens
Ink2	Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning
Ink3+12	Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning
KOL	
KOL1+11	Förekomst av diagnos KOL
KOL2	Andel patienter med KOL och underhållsbehandling som har varit på återbesök
KOL3	Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av KOL
KOL4	Andel patienter med KOL som fått återbesök inom 6 veckor efter exacerbation
KOL5	Andel patienter med KOL med uppmätt vikt eller BMI
KOL6+12	Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångstest
KOL7+13	Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker
KOL8+14	Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning
KOL9+15	Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning
KOL10+16	Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder
Kranskärslssjukdom	
Kr1	Förekomst av diagnos kranskärslssjukdom
Kr3	Andel patienter med kranskärslssjukdom och behandling med statiner
Kr4	Andel patienter med kranskärslssjukdom och behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia
Kr5	Andel patienter med kranskärslssjukdom som har varit på återbesök
Kr6	Andel patienter med kranskärslssjukdom och behandling med RAAS-hämmare
Kr7	Blodtryck vid kranskärslssjukdom

TIA/Stroke	
T/S1+5+11	Förekomst av diagnos TIA och stroke
T/S2	Andel patienter med TIA och/eller ischemisk stroke och behandling med statiner
T/S3	Andel patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök
T/S4	Blodtryck vid TIA och/eller stroke
T/S6+12	Andel patienter med stroke som tränat ADL
T/S7+13	Andel patienter med stroke som fått balansträning
T/S8+14	Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga

INFektioner

Luftvägar	
Inf 1+5+8+12+18+22	Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf 2+6+9+13+19+23	Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf 35+36	CRP vid övre/nedre luftvägsinfektion
Inf16	Andel positiva StrepA test av alla StrepA
Inf17	Andel antibiotikabehandlad faryngotonsillit med StrepA (pos/neg/ej taget)
Inf 3+7+10+14+20+24	Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf 4+11+15+21	Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (AOM, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni)
Inf 32+33	Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni)
Inf 61+61	Andel med fysiskt besök i samband antibiotikaföreskrivning (rinosinuit, tonsillit)

Urinvägar	
Inf25	Förekomst akut cystit /1000 listade
Inf26	Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten
Inf 27+28+29+30+31	Andel antibiotikabehandling akut cystit hos kvinnor/män (all antibiotika, förstahandsantibiotika, kinoloner)
Inf34	Andel akut cystit hos män med fysiskt läkarbesök för diagnos

Hud- och mjukdelar	
Inf 37+40+45+49+53+57	Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom, ospecifik hudinfektion)
Inf 38+41+46+50+54+58	Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom, ospecifik hudinfektion)
Inf 42+51+55	Andel antibiotikabehandling (impetigo, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)
Inf 39+43+47+59	Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia, impetigo, erysipelas, ospecifik hudinfektion)
Inf 44+48+52+56+60	Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaföreskrivning (impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom, ospecifik hudinfektion)

PSYKISK OHÄLSA

Depression	
Dep1	Förekomst av diagnos depression
Dep2	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta
Dep3	Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel
Dep4	Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression
Dep5	Andel patienter med depression som har varit på uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel
Dep6	Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad depression
Dep7	Andel patienter som fått IPT vid nydiagnostiserad depression
Dep8	Andel patienter som fått PDT vid nydiagnostiserad depression
Ångest	
Ån1	Förekomst av diagnos ångest
Ån2	Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta
Ån3	Andel patienter med ångest och antidepressiva läkemedel
Ån4	Andel patienter som har varit på återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i ångest
Ån5	Andel patienter med ångest som har varit på uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel
Ån6	Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad ångest
Ån7	Andel patienter med ångest som fått bensodiazepiner
Dep/Ån1	Andel patienter med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest senaste 24 månaderna