


Användningsområden för PrimärvårdsKvalitet



I korthet

PrimärvårdsKvalitet är:

- Ett evidensbaserat system för lärande, förbättringsarbete och analys av primärvården lokalt, regionalt och nationellt
- Enkelt att använda – automatisk hämtning ur befintliga system
- Utvecklat av primärvårdens professioner

Kontakt

primarvardskvalitet@skl.se



Följ PrimärvårdsKvalitet på Facebook



Mer information

På www.primarvardskvalitet.se finner du bl.a:

- Introduktionsmaterial för att börja arbeta med PrimärvårdsKvalitet på VC och rehab
- Arbetsmaterial för att arbeta med olika indikatorområden
- Fördjupning om indikatorerna
- Mer information om det nationella arbetet med PrimärvårdsKvalitet
- Införandestöd för regionerna
- Lärande exempel hur olika VC och regioner arbetar med PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet Psykisk ohälsa

Analys Reflektion Lärande

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet utvecklas av primärvårdens professioner och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor.

PrimärvårdsKvalitet innehåller en nationell standard för evidensbaserade kvalitetsindikatorer som hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering. Uppdatering till nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Den här foldern innehåller indikatorer för psykisk ohälsa. Mer information www.primarvardskvalitet.se.

Ett arbete i samverkan mellan:



SFAM



NATIONELLA KVALITETSREGISTER



En del av omställningen till Nära vård

Sammanfattning av indikatorer för psykisk ohälsa

Kontinuitet	
Ko1	Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom
Ko3	Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet
Samsjuklighet	
Ss1	Andel patienter med 2-≥5 kroniska sjukdomar
Prioritering	
Pr1	Andel patienter med kronisk sjukdom som fått återbesök
Pr3	Behandling vid depression och samsjuklighet
Samverkan	
Sa1	Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i primärvård
Sa2	Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i primärvård eller på sjukhus
Äldre	
Äld3	Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥ 75 år
Äld4	Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥ 75 år
Läkemedel	
Lm3	Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5	Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤30 tabletter
Lm6	Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8	Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepiner ≤25 tabletter
Levnadsvanor*	
Le3	Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom
Le4	Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom
Le7	Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet
Le8	Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom
Le9	Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol
Le10	Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom
Le11	Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor
Le12	Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom

*Särskilda levnadsvaneindikatorer finns för depression, stress och demens.

Depression	
Dep1	Prevalens av diagnos depression
Dep2	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta
Dep3	Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel
Dep4	Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression
Dep5	Andel patienter med depression som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel
Dep6	Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad depression
Dep7	Andel patienter som fått IPT vid nydiagnostiserad depression
Dep8	Andel patienter som fått PDT vid nydiagnostiserad depression
Ångest	
Ån1	Prevalens av diagnos ångest
Ån2	Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta
Ån3	Andel patienter med ångest och antidepressiva läkemedel
Ån4	Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i ångest
Ån5	Andel patienter med ångest som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel
Ån6	Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad ångest
Ån7	Andel patienter med ångest som fått bensodiazepiner
Dep/Ån1	Andel patienter med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest senaste 24 månaderna
Demens	
Dem1	Prevalens av diagnos demens
Dem2	Andel patienter med demens och antipsykotika
Dem3	Andel patienter med demens som fått återbesök
Dem4	Andel patienter med Alzheimerdemens som fått demensläkemedel
Dem5	Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6	Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut
Dem7	Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel